
Multimed 2026; 30: e3332

Artículo original

Comportamiento del embarazo en adolescentes: estudio observacional

Adolescent Pregnancy Patterns: An Observational Study

Comportamento da gravidez na adolescência: estudo observacional

Felicita Dayneris Torres Carrillo^{I*},  <https://orcid.org/0009-0004-6177-0110>Lourdes Montero Balibrea^{II},  <https://orcid.org/0009-0008-3944-4158>Miguel Manuel Franco Milanés^{III}  <https://orcid.org/0009-0003-5399-2971>Alexeis Oliva Machado^{IV}  <https://orcid.org/0009-0006-9902-0563>Evora María Quesada Fernández^V  <https://orcid.org/0000-0002-0253-9937>^I Policlínico Universitario Ángel Ortiz Vázquez. Provincia Granma. Cuba.^{II} Policlínico Luis Enrique de la Paz Reyna. Provincia Granma. Cuba.^{III} Hospital Universitario Celia Sánchez Manduley. Provincia Granma. Cuba.^{IV} Facultad de Ciencias Médicas Celia Sánchez Manduley. Provincia Granma. Cuba.^V Universidad de Ciencias Médicas de Granma. Provincia Granma. Cuba.Autor para la correspondencia: dayneristorres3@gmail.com.**RESUMEN**

La presente investigación se realizó con el objetivo de describir el comportamiento del embarazo en la adolescencia, mediante un estudio observacional descriptivo prospectivo de corte transversal en el Policlínico Luis Enrique de la Paz Reyna del municipio Manzanillo, en la provincia Granma. Durante el período comprendido del mes de enero a diciembre 2025. El Universo de estudio estuvo conformado por 56 embarazadas, se trabajó con una muestra de 25 pacientes mediante el muestreo aleatorio simple, atendiendo a los criterios de inclusión y exclusión. Los resultados se representaron en tablas, se emplearon los métodos teóricos, empíricos y estadísticos

Esta obra de Multimed se encuentra bajo una licencia
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

descriptivos (dentro de ella el cálculo porcentual). Existió un predominio de adolescentes en edades comprendidas entre 17 y 18 años, con un nivel educacional medio. Las complicaciones más frecuentes fueron el parto pretérmino, el bajo peso al nacer y la anemia. La dependencia económica, los ingresos bajos, el abandono de la vida social y la deserción escolar fueron las consecuencias predominantes, debido al embarazo en adolescentes.

Palabras claves: Embarazo en la adolescencia; Complicaciones; Consecuencias.

ABSTRACT

This study aimed to describe the patterns of adolescent pregnancy through a prospective, descriptive, cross-sectional observational study conducted at the Luis Enrique de la Paz Reyna Polyclinic in the municipality of Manzanillo, Granma Province, from January to December 2025. The study population consisted of 56 pregnant adolescents, and a sample of 25 patients was selected using simple random sampling, according to the inclusion and exclusion criteria. The results were presented in tables. Theoretical, empirical, and descriptive statistical methods were used, including percentage calculations. Adolescents aged 17–18 years, with a medium level of education, predominated. The most frequent complications were preterm birth, low birth weight, and anemia. Economic dependence, low income, withdrawal from social life, and school dropout were the predominant consequences associated with adolescent pregnancy.

Keywords: Adolescent pregnancy; complications; consequences.

RESUMO

Esta pesquisa teve como objetivo descrever o comportamento da gravidez na adolescência, por meio de um estudo observacional descritivo, prospectivo e transversal, realizado na Policlínica Luis Enrique de la Paz Reyna, no município de Manzanillo, província de Granma, no período de janeiro a dezembro de 2025. A população do estudo foi constituída por 56 gestantes adolescentes, e foi selecionada



uma amostra de 25 pacientes por meio de amostragem aleatória simples, de acordo com os critérios de inclusão e exclusão. Os resultados foram apresentados em tabelas. Foram utilizados métodos teóricos, empíricos e estatísticos descritivos, incluindo o cálculo percentual. Houve predominância de adolescentes com idades entre 17 e 18 anos e nível educacional médio. As complicações mais frequentes foram o parto prematuro, o baixo peso ao nascer e a anemia. A dependência econômica, a baixa renda, o afastamento da vida social e a evasão escolar foram as consequências predominantes associadas à gravidez na adolescência.

Palavras-chave: Gravidez na adolescência; complicações; consequências.

Recibido: 12/03/2026

Aprobado: 12/10/2026

Introducción

La atención primaria de salud (APS) constituye uno de los niveles de atención del Ministerio de Salud Pública, en el que se conciben, entre otros, servicios de promoción, prevención y educación, esto constituye un aporte en Cuba, la implementación y desarrollo del Programa del Médico y la Enfermera de la Familia con la participación de la comunidad en la solución de problemas de salud. Las actividades que en este se realizan con los adolescentes permiten educar sobre la necesidad de asumir la sexualidad de manera responsable, promover la planificación familiar, la maternidad y la paternidad consciente, con el propósito de favorecer la salud sexual y desarrollar un sentimiento hacia la prevención. ⁽¹⁾

Los sistemas de salud y educación desde el propio triunfo de la Revolución se encuentran enfrascados en una tarea común: orientar y proteger a los adolescentes y jóvenes, en especial a las féminas para transmitir un comportamiento sexual seguro que evite los embarazos prematuros y las enfermedades de transmisión sexual. Sin embargo



todos estos esfuerzos no llegan al éxito propuesto, pues se refleja un aumento alarmante en el número de embarazos en la adolescencia, reflejo de los deficientes servicios de salud dentro de las funciones de promoción y prevención incidiendo de manera significativa sobre todo a nivel mundial.⁽²⁾

El embarazo en la adolescencia es definido como un “problema” al vincularse con consecuencias no deseadas ni previstas como el aborto, el abandono y el maltrato de los niños y variados conflictos conyugales y familiares, dependencia económica del grupo familiar, delegación del cuidado de los hijos, uniones conyugales forzadas, abandono de los estudios, dificultades en la inserción laboral y variados problemas de salud del niño y su madre.

Se requiere de una mirada mucho más abierta del tema del embarazo en adolescentes como fenómeno de interés contemporáneo que debe ser abordado desde la mirada funcional como ruido en el ciclo vital, pero también desde una ojeada más comprensiva que involucre el significado social del embarazo, considerando las diferencias culturales e históricas que posibiliten un diálogo académico y político más adecuados a la complejidad del problema social y unas acciones más eficaces en el tratamiento específico del embarazo en adolescentes como problema.⁽³⁾

Entender la incidencia y prevalencia del embarazo en la adolescencia y sus factores de riesgo asociados en áreas comunitarias resulta de vital importancia. Es prioritario para las autoridades sanitarias ejecutar recursos dirigidos a combatir esta situación de salud, con el objetivo de que en un futuro las tasas de incidencias y prevalencia disminuyan y así poder reducir el impacto tanto económico para el sistema de salud como social para los pacientes.

Por todo lo anteriormente expuesto, surge el interés de establecer conocimientos, actitudes, prácticas y antecedentes sobre el control de los factores de riesgos que influyen en la presencia de un embarazo en la adolescencia, por lo que conlleva la formulación del **problema científico**: ¿cuáles factores socioeconómicos y demográficos están relacionados con el embarazo en la adolescencia en el Policlínico Comunitario Luis Enrique de la Paz Reyna, de Manzanillo, provincia Granma?



Objetivo: describir el comportamiento del embarazo en la adolescencia en el Policlínico Luis Enrique de la Paz Reyna de Manzanillo, Granma.

Métodos

Se realizó un estudio observacional descriptivo prospectivo y transversal, con el objetivo de describir el comportamiento del embarazo en la adolescencia del Policlínico comunitario Luis Enrique de la Paz Reyna en el período de enero a diciembre 2025, en Manzanillo, provincia Granma. El universo estuvo conformado por 56 embarazadas adolescentes. Se escogió una muestra de 25 embarazadas mediante el muestreo aleatorio simple atendiendo a los criterios de inclusión y exclusión que representó el 44.6 %.

Criterios de inclusión

- Pacientes que por su voluntariedad deseen participar en el estudio.
- Adolescentes captadas en el área de salud en el período de estudio.
- Residente en el área de salud en el momento del estudio.
- Estar embarazada.
- Tener más de 10 y menos de 20 años.

Criterio de exclusión

- Incapacidad mental.
- Pacientes cuyas historias clínicas presenten errores u omisiones que invaliden la información necesaria para el estudio.

Operacionalización de las variables



- Edad: variable cuantitativa continua, se utilizó la siguiente escala, menor de 15 años, de 16-17 años, 18-19 años. Se expresó en frecuencias absolutas y frecuencias relativas (%).
- Nivel escolar: variable cualitativa ordinal politómica, se utilizó como escala, primaria, secundaria básica, preuniversitario y universidad iniciada, según grado escolar alcanzado. Se expresó en frecuencias absolutas y frecuencias relativas (%).
- Complicaciones: variable cualitativa ordinal politómica, se utilizó como escala, prematuridad y bajo peso, anemia, diabetes mellitus gestacional, trastornos hipertensivos, alteraciones psicológicas, definidas según las complicaciones que tenga la paciente. Se expresó en frecuencias absolutas y frecuencias relativas (%).
- Consecuencias: variable cuantitativa ordinal politómica, en la escala utilizada se encuentran deserción escolar, nivel educacional bajo, ingresos bajos, dependencia económica, abandono de la vida social, definidas como las consecuencias del embarazo en las pacientes. Se expresó en frecuencias absolutas y frecuencias relativas (%).

La recolección de datos se llevó a cabo, según el propósito e intereses del estudio, registrados sistemáticamente a medida que fueron obtenidos de las fuentes de información declaradas en el formulario creado al efecto. La información de la investigación se obtuvo mediante la revisión bibliográfica actualizada; se utilizaron los datos obtenidos de las historias clínicas de los pacientes, así como los datos archivados, registros históricos del departamento de estadísticas de la Dirección Municipal de Salud de Manzanillo y del Policlínico 4 Luis Enrique de la Paz Reyna. Una vez obtenida la información mediante la recolección de los datos se procesaron de forma manual y computarizada para lo cual se creó una base de datos en el sistema Excel de una

computadora de escritorio con sistema operativo Windows, se emplearon métodos estadísticos descriptivos (dentro de ella el cálculo porcentual).

Se solicitó la aprobación del Comité de Ética Médica del Policlínico Luis Enrique de la Paz Reyna de Manzanillo. Se prescindió del consentimiento informado de los pacientes, teniendo en cuenta los principios éticos y pautas elaboradas sobre investigación biomédica en seres humanos en el ámbito internacional como el código de Nuremberg de 1947, la declaración de Helsinki, Finlandia, promulgada en 1964 y probada en la 18 va World medical assambly corregida por el 29 en Tokio, septiembre de 1978 así como la 52 Asamblea General de Edimburgo, Escocia en Octubre del 2000.

Resultados

En las pacientes objeto de estudio predominó el rango de edades de 17 a 18 años para un 60 %. El 12 % correspondió a las que tenían entre 15 y 16 y el 28 % a las de 19 años.

Tabla1: Distribución de las pacientes según grupos de edades.

Edad	Pacientes	%
15 y 16	3	12
17 y 18	15	60
19	7	28
Total	25	100

Fuente: Historia clínica

El 16 % de las pacientes tenía la secundaria básica, el 60 % el preuniversitario y el 24 % la universidad iniciada.

Tabla 2: Distribución de las pacientes según nivel escolar.

Nivel escolar	Pacientes	%
Primaria	0	0
Secundaria básica	4	16
Preuniversitario	15	60
Universidad iniciada	6	24



Total	25	100
-------	----	-----

Fuente: Historia clínica

Las principales complicaciones del embarazo en la adolescencia son la prematuridad y el bajo peso con un 52 % seguido por la anemia con un 24 %.

Tabla 3: Distribución de las pacientes según principales complicaciones.

Complicaciones	Pacientes	%
Prematuridad y bajo peso al nacer	13	52
Anemia	6	24
Diabetes Mellitus gestacional	1	4
Trastornos hipertensivos	3	12
Alteraciones psicológicas	2	8
Total	25	100

Fuente: Historia clínica

La dependencia económica y los ingresos bajos constituyen las principales consecuencias del embarazo en la adolescencia.

Tabla 4: Distribución de las pacientes según principales consecuencias.

Consecuencias	15 y 16	%	17 y 18	%	19	%
Deserción escolar	0	0	1	4	1	4
Nivel educacional bajo	0	0	0	0	1	4
Ingresos bajos	6	24	8	32	4	16
Dependencia económica	9	36	3	12	4	16
Abandono de la vida social	3	12	1	4	0	0
Total	18	72%	13	52%	10	40%

Fuente: Historia clínica

Discusión



Esta obra de Multimed se encuentra bajo una licencia <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

La primera variable sociodemográfica que se analiza en el estudio realizado está relacionada con la edad en las adolescentes objetos de investigación. Existió un franco predominio entre los 17 y 18 años de edad. Mariño-Membribes ⁽⁴⁾ encuentran en sus estudios adolescentes entre 12 y 17 años en estado de gestación y sin conocimientos sobre sus posibles riesgos. Gonzaález-Pérez R y Rodríguez Mateo M ⁽⁵⁾ obtuvieron como resultado que el grupo de edad más representado fue de 14 a 16 años, con un total de 26 representantes para un 52 %.

En la investigación también se analiza la variable nivel de escolaridad de las adolescentes. Se encuentra como aspecto positivo que la mayoría de las adolescentes posee un buen nivel educacional, la mayoría de ellas estudian y otras estudian y trabajan. Ramírez Hernández S y Herrera Padrón E ⁽⁶⁾ realizaron un estudio descriptivo de corte longitudinal prospectivo en el que obtienen como resultados que el 78.2 % tienen dificultad para planear proyectos futuros y el 78.2 % tiene bajo nivel educacional. Esquivel Tamayo JA et al ⁽⁷⁾, alerta que a pesar de que los adolescentes van venciendo años de estudio aún desconocen muchos aspectos relacionados con el embarazo en edades tempranas del desarrollo, por lo que se debe nutrir de conocimientos usando todos los medios educativos al alcance.

En el actual estudio las principales complicaciones maternas están relacionadas con la aparición de la anemia así como una mayor aparición de partos pretérmino y bajo peso al nacer. El impacto en la salud adolescente se mide por los indicadores de mortalidad materna y perinatal. Las complicaciones maternas en la gestación de la adolescente, se pueden clasificar por los períodos de gestación. En la primera mitad del embarazo se destacan el aborto, la anemia, las infecciones urinarias y vaginales; en la segunda mitad los cuadros hipertensivos, la rotura prematura de membranas ovulares, las hemorragias asociadas a afecciones placentarias, la escasa ganancia de peso con malnutrición materna asociada y el parto pretérmino. ⁽⁸⁾

Portal Amador ⁽⁹⁾, al investigar a los recién nacidos bajo peso de su estudio, encuentra que el 51.9 % corresponden a madres adolescentes, por lo que existe una relación altamente significativa, por lo que constituye la adolescencia un factor de



riesgo para desarrollar este indicador, datos que se relacionan con la presente investigación. Gallo Castro et al ⁽¹⁰⁾, en su revisión sistemática de 15 artículos en adolescentes embarazadas de Brasil, encuentran que las principales complicaciones perinatales son la prematuridad y el bajo peso al nacer.

La presente investigación coincide con otros autores que en la atención primaria de salud las adolescentes embarazadas de sus comunidades refieren que la anemia, la amenaza y/o parto pretérmino, además de la desnutrición por defecto y la infección urinaria están dentro de las morbilidades más frecuentes en este grupo poblacional. Refieren que el parto pretérmino predominó con un 50 % sobre el a término en un 25 %, estos resultados coinciden con los descritos en la literatura en la que existe un predominio de partos pretérminos en las adolescentes.

En el presente estudio las adolescentes, como consecuencia del embarazo en esta etapa de la vida, tienen dependencia económica de la familia con ingresos bajos, abandono de la vida social y en la mayoría deserción escolar. La generalidad de los autores consultados, mencionan como resultados del embarazo adolescente, la precariedad económica, escolaridad baja, relación de pareja no estable, autoestima baja y problemas de rechazo social, que pueden interactuar con la edad de la gestante adolescente; pues la inmadurez biológica constituye una posible causa de estos resultados adversos además de los factores sociales.

Como expresa Salgado-Selema, et al ⁽¹¹⁾ el embarazo en las adolescentes tiene una gran repercusión en el desarrollo de la mujer, pues además de lo señalado generalmente se producen dificultades para su incorporación al mercado laboral y abandono del estudio, así mismo en un alto porcentaje de los casos se convierten en madres solteras con el consecuente impacto personal, familiar y social. Jiménez Zarate ⁽¹²⁾ describe esta situación como una sensación de “haber dejado de vivir la vida” y es lo que mejor expresa el impacto que tiene en sus vidas la llegada de un embarazo no deseado. En definitiva se cree que lo que afecta gravemente una maternidad tan temprana es el proyecto de vida de una mujer adolescente, opinión compartida por la investigadora.



El embarazo en la adolescencia es un problema de salud, tiene factores de riesgo estudiados y agrupados en relación a sus características multifactoriales. El reconocimiento del riesgo que representa constituye una problemática real, motivo de inquietud por disímiles profesionales de la salud dedicados a su estudio.⁽¹³⁾ Los hallazgos de la actual investigación están de acuerdo con lo reportado por varios autores en estudios nacionales e internacionales ya referenciados, en los que se evidencian significativas diferencias en los resultados maternos y perinatales en las gestantes adolescentes.

Canelles Silva⁽¹⁴⁾ al estudiar los recién nacidos bajo peso de su estudio encontró más del 50 % correspondían a madres adolescentes, por lo que existe una relación altamente significativa, constituyéndose la adolescencia un factor de riesgo para desarrollar este indicador, datos que se relacionan con la presente investigación. Es de considerar que la aparición de complicaciones encontradas en las adolescentes en general, puede estar influenciado por factores socioeconómicos, culturales, nutricionales y de comportamiento. En la actualidad el embarazo y maternidad de adolescentes son más frecuentes de lo que la sociedad quisiera aceptar. Es un suceso difícil que afecta la salud integral de los padres adolescentes, la de sus hijos, familiares y de la comunidad en su conjunto.⁽¹⁵⁾

La maternidad en la adolescencia es un fenómeno que merece especial atención debido sus implicaciones no solo en la vida de los jóvenes, sino también en la de sus familias, pareja y en el desarrollo del niño. La atención de la salud y del embarazo en la adolescente implica la búsqueda de alternativas basadas en las características particulares de su crecimiento y desarrollo y de su enorme deseo de no ser considerada ni la niña de ayer ni la mujer de mañana, sino la adolescente que es hoy.

Conclusiones



Existió un predominio de adolescentes en edades comprendidas entre 17 y 18 años, con nivel educacional medio (preuniversitario). Dentro de las complicaciones producidas por el embarazo en las adolescentes estuvieron: la prematuridad, el bajo peso al nacer y la anemia. La dependencia económica y los ingresos bajos fueron las principales consecuencias del embarazo en las adolescentes.

Referencias bibliográficas

1. Ministerio de Salud Pública. Programa del médico y enfermera de la familia. 2ed [Internet]. La Habana. Ciencias Médicas; 2023. [citado 8/10/2026]. Disponible en: http://bvs.sld.cu/libros_texto/programa_medicoenfermera_2daed/programa_medico_enfermera_familia_2da.edicion.pdf
2. Molina Gómez A, Hernández Ávalos L. Condicionantes y consecuencias sociales del embarazo en adolescentes de los consultorios 6 y 18 del Policlínico Fabio D´Celmo. Caonao. Revista Cubana de Obstetricia y Ginecología [Internet]. 2021 [citado 25/4/2025]; 47(2):e571. Disponible en: <https://www.medigraphic.com/pdfs/revcubobsgin/cog-2021/cog212b.pdf>
3. Da Silva Leiva FD. Anemia durante el embarazo en mujeres jóvenes. Rev UN Med [Internet]. 2020 [citado 25/4/2025]. 9(2):7.1-7.14. Disponible en: <https://investigacion.uninorte.edu.py/wp-content/uploads/MED-0902-07.pdf>
4. Mariño Membribes E, Ávalos González M. Impacto del embarazo en la adolescencia en un grupo básico de trabajo en la atención primaria de salud. Revista Cubana de Obstetricia y Ginecología [Internet]. 2021 [citado 30/4/2025]; 46(4):e504. Disponible en: <https://revginecobstetricia.sld.cu/index.php/gin/article/view/504>
5. González-Pérez R, Rodríguez-Mateo M, Naranjo-Hernández Y, Concepción-Pacheco J. Comportamiento del embarazo adolescente en el municipio Jatibonico. Revista Cubana de Obstetricia y Ginecología [Internet]. 2021 [citado 25/4/2025]; 47(1):e707. Disponible en: <https://revginecobstetricia.sld.cu/index.php/gin/article/view/46/39>



-
6. Ramírez Hernández S, Herrera Padrón E, Lazo Cruz Y. Caracterización epidemiológica de las adolescentes embarazadas en Pinar del Río. Rev Ciencias Médicas [Internet]. 2024 [citado 30/4/2025]; 28(1):e6242. Disponible en: <http://scieloprueba.sld.cu/pdf/rpr/v28n1/1561-3194-rpr-28-01-e6242.pdf>
 7. Esquivel Tamayo JA, Peña Laguna YC. Caracterización psicosocial de las embarazadas adolescentes del área de salud del Policlínico Docente “Manuel Fajardo Rivero”. Rev Ciencias Médicas [Internet]. 2023 [citado 30/4/2025]; 27(4):e5887. Disponible en: <http://scieloprueba.sld.cu/pdf/rpr/v27n4/1561-3194-rpr-27-04-e5887.pdf>
 8. González Betancourt E, García Baró Y. La prevención del embarazo en la adolescencia desde un enfoque interdisciplinario, humanista, activo y transformador. Rev.Med.Electrón. [Internet]. 2024 [citado 6/6/2025]; 46:e5551. Disponible en: <http://scieloprueba.sld.cu/pdf/rme/v46/1684-1824-rme-46-e5551.pdf>
 9. Portal Amador M, González Hermida AE, Monjes Pérez ME, Santos González B. Caracterización del embarazo en la adolescencia en un consultorio médico. Cienfuegos 2009-2023. Medisur [Internet]. 2024 Jun [citado 6/6/2025]; 22(3): 479-86. Disponible en: <http://scieloprueba.sld.cu/pdf/ms/v22n3/1727-897X-ms-22-03-479.pdf>
 10. Gallo Castro JC, Viteri López MJ, Hernández Gallardo D, Maqueira Caraballo G de la C. Ejercicios adaptados para la inclusión de adolescentes embarazadas a la clase de Educación Física. Ciencia y Deporte [Internet]. 2024 [citado 6/6/2025]; 9(2), 352-67. Disponible en: <https://dspace.ube.edu.ec/server/api/core/bitstreams/042eb174-ff30-4379-ba6b-954812d7a145/content>
 11. Salgado Selema G, Bello Zamora L, Morales Núñez H, Morales Bello H. Factores biopsicosociales del embarazo en la adolescencia. Manzanillo 2018. MULTIMED [Internet]. 2020 [citado 6/6/2025]; 24(2): 247-59. Disponible en: <https://revmultimed.sld.cu/index.php/mtm/article/view/1899/1918>
 12. Jimenez Zarate M, Zambrano Acosta JM, Chica Chica LF. Orientación familiar y embarazo adolescente no deseado: retos, desafíos y oportunidades para su prevención. Pentaciencias [Internet]. 2024 [citado 8/10/2025]; 6(2):316-29. Disponible en: <https://editorialalema.org/index.php/pentaciencias/article/view/1057>
-



13. Góngora Ávila CR, Fernández Borrego D, Mejías Arencibia RA, Vázquez Carvajal L, Frías Pérez AE. Características sociodemográficas que influyen en el embarazo en la adolescencia. Rev. cuba. obstet. ginecol. [Internet]. 2022 [citado 7/10/2025]; 48(1):e976. Disponible en: <https://revginecobstetricia.sld.cu/index.php/gin/article/view/6/4>
14. Canelles Silva D. Intervención Educativa sobre Factores de Riesgo del Bajo Peso al Nacer. Consultorio 21. Policlínico Báguanos. 2019-2021". Tesis. Báguanos. 2021. Holguín [Internet]. 2021 [citado 6/6/2025]; Disponible en: <https://tesis.hlg.sld.cu/index.php?P=FullRecord&ID=2421&ReturnText=Search+Results&ReturnTo=index.php%3FP%3DAdvancedSearch%26Q%3DY%26FK%3DIntervenci%25C3%25B3n%2BEducativa%2Bsobre%2BFactores%2Bde%2BRiesgo%2Bdel%2BBajo%2BPe so%2Bal%2BNacer.%2BConsultorio%2B21.%2BPolicl%25C3%25ADnico%2BB%25C3%25A1guanos.%2B2019-2021%2522%26RP%3D5%26SR%3D0%26ST%3DQuick>
15. Díaz Asenjo PJ, Fajardo Quispe CS. El embarazo en la adolescencia desde la perspectiva actual en COVID-19. Rev Cubana Pediatr [Internet]. 2021 [citado 8/10/2026]; 93(2): e1444. Disponible en: <https://revpediatria.sld.cu/index.php/ped/article/view/1444/790>

Conflicto de interés

Los autores declaran la no existencia de conflicto de intereses

Contribución de autoría

Conceptualización, investigación, administración del proyecto, análisis formal, redacción del borrador inicial: Felicita Dayneris Torres Carrillo.

Metodología, supervisión, validación: Lourdes Montero Balibrea, Miguel Manuel Franco Milanés.

Curación de datos, redacción de la revisión y edición: Alexeis Oliva Machado, Evora María Quesada Fernández.

